UFFICIO TECNICO

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 18 ottobre 2024

AUTORIZZATO SU SOIA IL DISSECCANTE SPOTLIGHT PLUS

Velocizza la maturazione di foglie, stelo e bacelli, rappresentando un aiuto per la naturale senescenzadella soia. ***Spotlight® Plus****, un prodotto ad azione erbicida a base di carfentrazone-etile (molecola appartenente alla famiglia dei triazolinoni) sviluppato dalla società FMC,* ***ha ottenuto la deroga per l'utilizzo di emergenza su soia a partire dal 7 ottobre 2024.***

Tempi e dosi di impiego su soia

Il prodotto, attivo esclusivamente per contatto, va utilizzato in pre-raccolta a BBCH 85-89, quando almeno il 50% dei baccelli sono maturi fino alla completa maturazione. Il dosaggio di utilizzo è 1 litro/ha in 300-600 litri d'acqua, assicurando un'accurata e uniforme distribuzione e una adeguata penetrazione del prodotto nella vegetazione. È consentita una sola applicazione per ciclo colturale. L'azione disseccante del prodotto velocizza la naturale senescenza di foglie, stelo e baccelli della soia,agevolando la successiva raccolta.

Su cultivar molto vigorose, su semine ritardate o con andamenti climatici che non favoriscono la naturale senescenza, l'applicazione di Spotlight® Plus agevola un più rapido disseccamento. Ricordiamo che Spotlight® Plus viene già utilizzato come erbicida su vivai di piante arbustive e arboree, vite, fruttiferi (melo, pero, susino, kiwi, pesco), agrumi, nocciolo e olivo.

Un erbicida per colture arboree

In questo caso Spotlight® Plus è impiegabile in miscela con altri erbicidi (totali, sistemici o di contatto) che ne completano lo spettro d'azione, ed è attivo nei confronti di alcune importanti infestanti che non sono adeguatamente controllate dai prodotti sistemici (glifosate), quali vilucchio (*Convolvolus arvensis*), malva (*Malva sylvestris*), porcellana (*Portulaca oleracea*), acetosella (*Oxalis acetosella*), menta (*Mentha piperita*), erba morella (*Solanum nigrum*), ortica (*Urtica dioica*), coniza (*Conyza canadiensis* e *bonariensis*) allo stadio di rosetta, grespino (*Sonchus spp.*), attaccamano (*Galium aparine*), amaranto (*Amaranthus spp.*), carota selvatica (*Daucus carota*), erodio (*Erodium spp.*). Infine,può essere impiegato come disseccante in pre-raccolta della patata e come spollonante su vite, kiwi,olivo, pesco, susino, melo, pero, agrumi.